

NOMBRE COMERCIAL (MATERIA ACTIVA)	PLAGAS QUE COMBATE	DOSIS MINIMA-MÁXIMA	DOSIS Y ÉPOCA RECOMENDADA	APLICACIONES AUTORIZADAS	MODO DE APLICACIÓN	PLAZO DE SEGURIDAD	LMR MÁXIMO	FIN DE AUTORIZACIÓN	FIN DE VENTA	FIN DE USO
CAL EX AVANT EW(ABAMECTINA1,8%)	Araña roja, trips, mosca blanca	0,5 c.c. /l no pasar de 150l/fanega	0,5 c.c. /l Otoño e invierno(embolsado) y primavera-verano (sin embolsar)	1 anual	Pulverizado ,contacto, solo o mezado con productos que combatan otras plagas	7 días	0,01ppm	30/04/2023		
GAZEL PLUS (ACETAMIPRID 20%)	Cochinilla, trips	0,25gr./l no pasar de 500gr. /ha (AL) 320gr./ha (IV)	Aplicar a esas dosis en verano y en otoño-invierno para embolsar	2 anuales	Pulverizado, mezado con otros productos que combatan otras plagas	21 días	0,01ppm	30/11/2023		
MOVENTO GOLD (SPIROTETRAMAT 10%)	Cochinilla, trips, araña roja, mosca blanca	0,45-0,75 c.c. /l	0,75 c.c./l desde primavera hasta otoño-invierno (suave)	2 anuales	Aplicar pulverizado (agitar bien el bote antes de usar)no se puede mezclar con gazel, cal ex, prevam, akira. No aplicar en floración	14 días	0,02ppm	30/04/2025		
KARATE XEON (LAMBDA CIHALOTRIN 10%)	Trips, mosca blanca, pulgones,orugas (menos)	0,01-0,02 c.c./l	0,015 c.c. /l su uso principal es en verano para la mosca y primavera y otoño los trips	1 anual	Aplicar pulverizado baja presión, tener en cuenta que no es eficaz contra la lagarta, es mejor usar bacillus, no se debe usar en floración. Si se usa no se puede utilizar akira el mismo año	7 días	0,15 ppm	31/03/2023		
AKIRA (LAMBDA CIHALOTRIN 2,5%)	Trips, mosca blanca, pulgones,orugas (menos)	0,4 gr.-0,8gr./l	0,5 gr. /l su uso principal es en verano para la mosca y primavera y otoño los trips	1 anual	Aplicar pulverizado, comparte 1 solo uso con karate xeon, si se usa uno no se puede usar otro en el mismo año. No se usa en floración	7 días	0,15 ppm	31/03/2024		

NOMBRE COMERCIAL (MATERIA ACTIVA)	PLAGAS QUE COMBATE	DOSIS MINIMA-MÁXIMA	DOSIS Y ÉPOCA RECOMENDADA	APLICACIONES AUTORIZADAS	MODO DE APLICACIÓN	PLAZO DE SEGURIDAD	LMR MÁXIMO	FIN DE AUTORIZACIÓN	FIN DE VENTA	FIN DE USO
KUMULUS DF (AZUFRE 80%)	Repelente de araña roja, hormigas y pulgones, fungicida (oidio)	1gr-10gr./l	Si es para piñas 1-2gr./l ,si es para viña en hoja a 10gr./l sobre todo en primavera a otoño, preventivo. Tambien para embolsar en invierno	2-4 Anuales	Aplicar diluido en agua, no mas de 2gr. Y 1,5gr./l si se da a piñas para no manchar y darlo de primavera hasta otoño para evitar la araña roja	N.P	N.P	31/12/2023		
BELTHIRUL (Bacillus Thuringensis Kurstaki 32 millones)	Orugas en los primeros estadios (pequeña)	0,5- 1 gr./l	Se recomienda a 1 gr./l y darlo de manera preventiva antes de tener ataques fuerte, siempre funciona mejor una semana antes de la luna llena, de primavera a otoño. Es bueno regular el ph a 6.5 y aplicar mojante Retenol para que se adhiera bien	2 anuales	Darlo diluido por en agua regulando el pH a 6.5, también se puede añadir a 1gr./l de azúcar para que se pegue y funcione mejor mejor una semana antes de la luna llena	N.P	N.P	30/04/2023		
PREVAM (ACEITE DE NARANJA 6%)	Araña roja, trips, mosca blanca	2c.c./l no pasar de 2l/ha	Aplicar a 2 c.c./l siempre en la época de primavera a otoño, en invierno no se recomienda puede manchar las piñas	6 anuales	Darlo diluido por en agua lo mas pulverizado posible, mojando bien todo. No mezcar con akira o karate xeon puede manchar con otros productos, no debe haber problema si respetamos las dosis recomendada	N.P	N.P	30/04/2022		

NOMBRE COMERCIAL (MATERIA ACTIVA)	PLAGAS QUE COMBATE	DOSIS MINIMA- MÁXIMA	DOSIS Y ÉPOCA RECOMENDADA	APLICACIONES AUTORIZADAS	MODO DE APLICACIÓN	PLAZO DE SEGURIDAD	LMR MÁXIMO	FIN DE AUTORIZACIÓN	FIN DE VENTA	FIN DE USO
BACTUR 2X(Bacillus Thuringensis Kurstaki 32 millones)	Orugas en los primeros estadios (pequeña)	0,5- 1 gr./l	Se recomienda a 1 gr./l y darlo de manera preventiva antes de tener ataques fuerte, siempre funciona mejor una semana antes de la luna llena, de primavera a otoño. Es bueno regular el ph a 6.5 y aplicar mojante Retenol para que se adhiera bien	10 anuales	Darlo diluido por en agua regulando el pH a 6.5, también se puede añadir a 1gr./l de azúcar para que se pegue y simpre mejor una semana antes de la luna llena	N.P	N.P	30/04/2023		
SPINTOR 480 SC (SPINOSAD 48%)	Trips y orugas en cualquier estadio(tamaño)	0,2-0,25c.c./l	En ataques fuerte hay que darlo a 0,25c.c./l y procurar darlo donde no le de el sol	1 anual	Darlo diluido en agua, remover bien el bote antes de utilizar, darlo por la tarde mejor o cuando el tiempo este sombrío, no exponer al sol, también bien temprano por la mañana	7 dias	0,02ppm	30/04/2023		

NOMBRE COMERCIAL (MATERIA ACTIVA)	PLAGAS QUE COMBATE	DOSIS MINIMA- MÁXIMA	DOSIS Y ÉPOCA RECOMENDADA	APLICACIONES AUTORIZADAS	MODO DE APLICACIÓN	PLAZO DE SEGURIDAD	LMR MÁXIMO	FIN DE AUTORIZACIÓN	FIN DE VENTA	FIN DE USO
AZUFEGA 80 LA (AZUFRE 80%)	Repelente de araña roja, hormigas y pulgones, fungicida (oidio)	1-5c.c./l	Si es para piñas 1-1,5 c.c./l, si es para viña u otros cultivos en hoja a 5c.c./l sobre todo en primavera a otoño preventivo. También para embolsar en invierno	6 anuales	Aplicar diluido en agua, remover bien el bote antes de diluir, no mas de 1,5c.c./l si se da a piñas para no manchar y darlo de primavera hasta otoño para evitar la araña roja	N.P	N.P	31/04/2023		
SUFREVIT (AZUFRE 80%)	Repelente de araña roja, hormigas y pulgones, fungicida (oidio)	1-5c.c./l	Si es para piñas 1-1,5 c.c./l ,si es para viña u otros cultivos en hoja a 5c.c./l sobre todo en primavera a otoño preventivo. También para embolsar en invierno	6 anuales	Aplicar diluido en agua, remover bien el bote antes de diluir, no mas de 1,5c.c./l si se da a piñas para no manchar y darlo de primavera hasta otoño para evitar la araña roja	N.P	N.P	31/04/2023		
SONDAE(OXAMILO 10%)	Nemátodos	5-15l/fanega	La dosis 3 c.c. /l al aire libre para pinchar los troncos que no tengan piña, solo se puede hacer una vez por planta. En goteo se puede dar a 1,5 c.c. planta tres veces separadas por 20 días	1 anual y localizada a troncos en aire libre. 3 anuales en goteo.	Aplicar cuidadosamente en los troncos que no esté parida la planta a tratar, la mejor época es después de cortar la mayoría de fruta, en goteo simplente aplicar en el riego en los últimos 30 min. de riego	7 días	0,01ppm	31/10/2023		